

- اقرأ بإمعان هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء.
- إنها تحتوي على معلومات هامة لمعالجتكم.
- احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
- إذا كان لديك أسئلة أو شك، أطلب توضيحات من طبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء وصف لك شخصيا، لا تعطه لشخص آخر و لو تشابهت الأعراض، فهو يضره.

تعريف الدواء:

أ- التسمية: بيرياكتين 4مغ/قرص.

ب- التركيب النوعي و الكمي:

سيروهيتادين (كلورهيدرات الألماني) 4.00 مغ لكل قرص
ما يعادل سيروهيتادين (كلورهيدرات)..... 4.34 مغ
السواغات: هيدروجينوفوسفات الكالسيوم ثنائي التمييه، لاكتوز احادي التمييه،
نشاء الذرة قبل جيلاتيني، نشاء البطاطا، ستيبارات المغنيزيوم، ك.ك.ل..... 1 قرص

ج- الشكل الصيدلاني:

علبة 30 قرص

د- القسم الصيدلاني العلاجي:

مضاد الهيستامين للإستعمال الجهازي.

(D): جلدي.

(R): الجهاز التنفسي.

صاحب قرار التسجيل/الصانع:

UPC، المنطقة الصناعية بالمال، حصة رقم 7 أ 25000 قسنطينة الجزائر.

كيف يستعمل هذا الدواء؟

أ- الجرعة:

لللكبار و الطفل الذي تجاوز سنه 6 سنوات،
الكبار: من 1 إلى 5 أقراص كحد أقصى في اليوم. عمومًا 3 أقراص موزعة على
3 مرات في اليوم.
الطفل الذي تجاوز سنه 6 سنوات: 2 إلى 3 أقراص موزعة على مرتين إلى 03
مرات في اليوم.
الجرعة الأكثر قوة تترك للمساء بسبب النعاس المرافق لهذا الدواء.

ب- طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم.

يجب أخذ الأقراص مع كأس ماء.

ج- أوقات إستعمال الدواء:

من الأفضل بدأ العلاج مساءً، الجرعات تكون متباعدة بحوالي 8 ساعات.

د- مدة العلاج:

العلاج يكون قصير المدى(بضعة أيام).

هـ- أعراض الإفراط في الجرعة

- متلازمة مضادات الكولين المركزية و المحيطية.
- إختلاج، توقف التنفس و توقف القلب (خاصة عند الأطفال).
- اضطرابات في الوعي، غيبوبة.

و- في حالة الإفراط في الجرعة:

إتصل بالطبيب أو مصلحة الإستجالات القريبة منك.

في أي حالة يستعمل هذا الدواء:

هذا الدواء مضاد هيستاميني: السيرهيتادين.

ينصح به في علاج أعراض الحساسية مثل:

-إلتهاب الأنف (في حالة زكام القش، إلتهاب الأنف غير الموسمي)

- الرمد.

- الطفح الجلدي

يستعمل عند الكبار و الطفل الذي يزيد عمره عن 6 سنوات.

حذاري:

أ في أي حالة لا يستعمل هذا الدواء:

هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في الحالات التالية:

- الطفل الأقل من 6 سنوات بسبب خطر مرور الدواء في المجاري الهوائية بدلا من المجاري الهضمية. الرجوع إلى الشكل الصيدلاني.
- أغرانولوسيتوز قديمة أو حديثة (إنخفاض معتبر في الكريات البيضاء في الدم)
- بعض أشكال زيادة الضغط في العين،
- الحساسية في التبول بسبب البروستات أو غيره،
- حساسية معروفة لمضادات الهيستامين،
- في حالة الشك من الأفضل أخذ رأي طبيبك أو الصيدلي.

ب- تحذيرات خاصة:

هذا الدواء لا يعالج إلا أعراض الحساسية، فمن الضروري إذا العثور على سببها،

إذا تواصلت الأعراض أو زادت إتصل بطبيبك.

في حالة ظهور حمى مرفوقة أو لا بعلامات عدوى (إلتهاب اللوزتين) بنسحوبة أو

بتعرق يستوجب تشييه طبيبك المعالج.

بسبب وجود اللاكتوز هذا الدواء لا يجب أن يستعمل في حالة الغالاكتوسيميا،

نقص إمتصاص الغلوكوز و الغالاكتوز أو نقص اللاكتاز (أمراض أيضية نادرة).

هذا الدواء يحتوي على مضاد هيستاميني: السيرهيتادين
أدوية أخرى تحتويه لا تجمعوها لكي لا تتجاوز المقدار المنصوح به
(راجع المقدار)

ج- إحتياطات الإستعمال:

في حالة القصور الكلوي (كل)، أو القصور الكبدى (كبد)، راجع طبيبك كي يعدل لك الجرعة.

أخذ هذا الدواء يتطلب رأي طبيب عند الأشخاص المسنين:

-المعرضين إلى الإمساك، إنخفاض الضغط في حالة الوقوف، الدوار أو النعاس.

-اضطرابات في البروستات،

و- في حالات إضطرابات الجهاز الهضمي (قرحة المعدة أو الإثني عشر)

إستشر طبيبك قبل أخذ هذا المضاد الهيستاميني.

المشروبات الكحولية أو الأدوية المحتوية على الكحول غير منصوح بها خلال فترة

العلاج لأنها تزيد من التأثير المنوم لهذا الدواء.

في حالة الشك لا تتردد في طلب رأي طبيبك أو الصيدلي.

د-التداخلات الدوائية و التداخلات الأخرى:

لتجنب تداخلات ممكنة بين عدة أدوية أعلم طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج

جاري.

هـ- الحمل و الإرضاع:

الحمل:

إستعمال هذا الدواء غير منصوح به أثناء الحمل.

إذا إكتشفت أنك حامل أثناء العلاج إتصلي سريعا بطبيبك كي يعدل علاجك

حسب وضعك.

الإرضاع:

بسبب عدم وجود معطيات عن مروره في الحليب ينصح بعدم أخذ هذا الدواء

أثناء الإرضاع.

على العموم خلال فترة الحمل و الإرضاع يجب أخذ رأي طبيبك أو الصيدلي

قبل أخذ أي دواء.

ف- السائقون و مستعملي الآلات:

الحذر مطلوب من سائقي و مستعملي الآلات بسبب مخاطر النعاس الراجعة

إلى إستعمال هذا الدواء خاصة في بداية العلاج. هذه الظاهرة تتزايد بأخذ

المشروبات الكحولية أو الأدوية المحتوية على الكحول.

و- قائمة السواغات ذات تأثير ملحوظ:

لاكتوز.

التأثيرات الغير مرغوب فيها و المزعجة:

كأي دواء آخر بيرياكتين يمكن أن يسبب عند بعض الأشخاص تأثيرات متفاوتة

الأهمية.

بعض التأثيرات الغير مرغوب فيها تتطلب إيقاف العلاج فوراً و إخبار

الطبيب.

ردود فعل حساسية:

طفح جلدي (حامي، فرفرة، شرى).

وذمة كوينكية (شرى مع إنتفاخ في الوجه و الرقبة مما يسبب صعوبة في

التنفس).

صدمة حساسية.

-إنخفاض هام في الكريات البيضاء في الدم مع ظهور أو زيادة الحمى مرفوقة

أو لا بعلامات عدوى إلتهاب، إنخفاض غير عادي في صفائح الدم قد يؤدي إلى

نزيف في الأنف أو اللثة، إنخفاض الكريات الحمراء في الدم.

بعض التأثيرات الأخرى غير المرغوب فيها يمكن حدوثها مثل:

زيادة في الشهية/ زيادة في الوزن، نعاس، نقص في اليقظة خاصة في بداية

العلاج، إضطرابات في الذاكرة أو التركيز، في التوازن، دوار (غالبا عند المسنين)،

إضطرابات في تناسق الحركات، رعاش، هلوسات و تخيلات، جفاف الفم

إضطرابات في الرؤية، قبض البول، إمساك، خفقان، إنخفاض في الضغط

الدومي عند الوقوف، نرح في إفراز الحليب، إضطرابات كبدية -صفراوية.

نادر:

علامات القلق: تعصب، تهيج، أرق.

آخر طبيبك أو الصيدلي بكل التأثيرات الغير مرغوب فيها أو المزعجة و الغير

مذكورة في هذه النشرة.

الحفظ:

عدم تجاوز تاريخ الإستعمال.

إحتياطات خاصة للحفظ:

يحفظ في درجة حرارة أقل من 25°م.

لا يترك في متناول و مرأى الأطفال.

رقم قرار التسجيل: 20/99/14F 025/285

تاريخ مراجعة النص: ديسمبر 2014



- **Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**
- Elle contient des informations importantes pour votre traitement
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donner jamais à quelqu'un d'autre même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT:

- a) DENOMINATION:** PERIACLINE 4 mg/comprimé.
b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:
 Cyproheptadine (chlorhydrate anhydre).....4,00mg pour un comprimé.
 Équivalent à Cyproheptadine (chlorhydrate)4,34mg
Excipients: hydrogénophosphate de calcium dihydraté, lactose monohydraté, amidon de maïs pré-gélatinisé, amidon de pomme de terre, stéarate de magnésium,QSP.....1 Comprimé.
c) FORME PHARMACEUTIQUE:
 Comprimés, Boîte de 30.
d) CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE:
 ANTIHISTAMINIQUE A USAGE SYSTEMIQUE
 (D : Dermatologie)
 (R : Système respiratoire).

DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT ET FABRICANT:

UPC Z.I. PALMA Lot. n°7A, 25000 Constantine Algérie.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT:

- a) POSOLOGIE:**
 RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 6 ANS.
 Adulte : 1 à 5 comprimés maximum par jour.
 En général, 3 comprimés à répartir dans la journée.
 Enfant de plus de 6 ans : 2 à 3 comprimés par jour à répartir en 2 à 3 prises par jour.
 La prise la plus forte sera réservée pour le soir en raison des possibilités de somnolence liées à ce médicament.
b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:
 VOIE ORALE.
 Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.
c) FREQUENCE ET MOMENT AUQUEL LE MEDICAMENT DOIT ETRE ADMINISTRE:
 Il est préférable de commencer le traitement le soir.
 Les prises seront espacées d'environ 8 heures.
d) DUREE DU TRAITEMENT:
 Le traitement doit être court (quelques jours).
e) SYMPTOME D'UN SURDOSAGE EN CYPROHEPTADINE:
 - Syndrome anticholinergique central et périphérique
 - Convulsions, arrêt respiratoire et cardiaque (surtout chez l'enfant),
 - Troubles de la conscience, coma.
f) CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:
 Consultez un médecin ou le service d'urgence le plus proche.

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT:

Ce médicament est un antihistaminique : la cyproheptadine. Il est indiqué dans le traitement symptomatique des manifestations allergiques telles que :
 - Rhinite (exemple : rhume de foin, rhinite non saisonnière), Conjonctivite, Urticaire,
 Chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.

ATTENTION !

- a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT:**
 Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants:
 -Enfant de moins de 6 ans en raison du risque de fausse route dû à la forme du comprimé,
 -Agranulocytose ancienne ou récente (baisse importante des globules blancs dans le sang),
 -Certaines formes de glaucome (augmentation de la pression dans l'oeil),
 -Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou due, à une allergie connue aux antihistaminiques.
 EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES:

- Ce médicament ne traite que les manifestations de votre allergie. Il convient d'en rechercher l'origine.
 Si les symptômes persistent ou s'aggravent, CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.
 En cas d'apparition d'une FIÈVRE, accompagnée ou non de signes d'infection (angine...) de pâleur ou de transpiration, il importe d'alerter immédiatement votre médecin traitant.
 En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares).
c) PRECAUTIONS D'EMPLOI:
 En cas d'insuffisance rénale (rein) ou hépatique (foie). CONSULTEZ VOTRE MEDECIN afin qu'il puisse adapter la posologie.
 La prise de ce médicament nécessite un AVIS MEDICAL chez les personnes âgées:

Ce médicament contient un antihistaminique, la cyproheptadine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose maximale, recommandée (cf chapitre Posologie).

- Prédisposées aux constipations, à l'hypotension orthostatique (baisse de la pression artérielle en position debout), aux vertiges ou à la somnolence.
- Présentant des anomalies de la prostate;
- Et en cas d'anomalie gastroduodénale (ulcère de l'estomac, du duodénum).
- PREVEZ VOTRE MEDECIN avant de prendre cet antihistaminique.
- Les boissons alcoolisées ou les médicaments contenant de l'alcool sont déconseillés pendant la durée du traitement en raison du risque de majoration de l'effet sédatif.
- EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.
- d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:**
 AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
- e) GROSSESSE ET ALLAITEMENT**
GROSSESSE:
 L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.
 Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.
ALLAITEMENT:
 En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, la prise de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement. D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre un médicament.
- f) CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES**
 L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence liés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.
 Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.
- g) LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE:**
 Lactose.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS:

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

- *Certains effets indésirables nécessitent d'ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR SON MEDECIN:
 -Réactions allergiques :
 De type éruption cutanée (érythèmes, purpura, urticaire), Oedème de Quincke (urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou pouvant entraîner une gêne respiratoire), Choc anaphylactique.
 -Baisse importante des globules blancs dans le sang pouvant se manifester par l'apparition ou la recrudescence d'une fièvre accompagnée ou non de signes d'infection, diminution anormale des plaquettes dans le sang pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives, baisse des globules rouges dans le sang.
 * D'autres effets indésirables peuvent survenir, tels que :
 Augmentation de l'appétit/prise de poids, somnolence, baisse de la vigilance, plus marquée en début de traitement, troubles de la mémoire ou de la concentration, de l'équilibre, vertiges (plus fréquents chez le sujet âgé), incoordination motrice, tremblements, confusion, hallucinations, sécheresse de la bouche, troubles visuels, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression artérielle lors du passage en position debout, tarissement de la sécrétion lactée, anomalies hépatobiliaires.
- * Plus rarement :
 Des signes d'excitation, agitation, nervosité, insomnie, peuvent survenir.
 SIGNALÉZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION:

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION:

A conserver à une température inférieure à 25°C. Tenir hors de la portée et la vue des enfants

DE n°: 20/99/14F 025/285

Date de mise à jour du texte: Décembre 2014



Fabriqué & conditionné par:
 UPC Z.I.PALMA N°7A 25000 Constantine Algérie