

إيكازيد® 50 مغ / 25 مغ

كابتوبريل / هيدروكلوروتيازيد أقراص قابلة للقطع

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل استعمال هذا الدواء.

- يجب احتوي على معلومات هامة لعلاجك.
- إذا كان لديك أسئلة أخرى، إذا كان لديك شك، اطلب معلومات أكثر من طبيبك أو الصيدلي.
- احتفظ بهذه النشرة فقد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
- إذا تعاقمت الأعراض أو استمرت، عليك بمراجعة الطبيب.
- هذا الدواء وصف لك شخصيا، لاتعلمه لشخص آخرولو تشابهت الأعراض، قد يضر.

الشكل الصيدلاني :

إيكازيد® أقراص قابلة للقطع ،علبة تحتوي على 30 قرص.

التركيب :

المادة الفعالة : كابتوبريل/ هيدروكلوروتيازيد 50 مغ / 25 مغ مع
سواغات : حمض الستريك ، لاكلوز أحادي التمييه، نشاء الزرة ميبلم، سيلولوز
ميكروكريستالين، ستيرات المغنيزيوم لكذلك قرص واحد .

سواغات ذات تأثير ملحوظ :

اللاكترولز : إيكازيد® أقراص تحتوي على 70.35 مغ من
اللاكترولز أحادي التمييه للقرص الواحد.

قائمة : 1

مانع للانزيم المحول للأنجيوتنسين مشترك مع مدر للبول المؤثر على الأنيوب
المتلف
العديد عن الفرون (C : الجهاز القلبي الوعائي) .

دواعي الاستعمال :

يستعمل إيكازيد® في حالات فرط الضغط الشرياني الأساسي.

في حالة الفشل العلاجي بالكابتوبريل فقط أو الهيدروكلوروتيازيد فقط .

موانع الاستعمال :

- الحساسية المفرطة للمادة الفعالة، أحد السواغات أو أي مانع للانزيم المحول للأنجيوتنسين أو أي سولفايد آخر.
- سوابق الإصابة بوميات النوحه نتيجة استعمال مانع للانزيم المحول للأنجيوتنسين
- ودمة الوجه ورائية مجبولة السبب.
- عجز كلوي حاد (تصفية الكرياتينين > 30 مل/د).
- قصور أو فشل كبدي حاد .
- التثالي التائي و التثالث من الحمل .

الاستعمالات :

الجرعة :

تحدد الجرعة من طرف الطبيب.
الجرعة اليومية هي قرص واحد في اليوم على شكل جرعة أو جرعتين.
يجب مراعاة الوصفة الطبية.

كيفية وطريقة الاستعمال :

عن طريق الفم .
أوقات استعمال الدواء :
يجب أخذ الدواء صباحا .

مدة العلاج :

يجب استعمال الدواء بشكل منتظم مع الالتزام بالمدة التي وصفها الطبيب مهما كانت طويلة.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال :

- عند استعمال إيكازيد® يجب الانتباه للحالات التالية :
- القيء أو الإسهال الشديد .
- اتباع حمية منخفضة الصوديوم أو استعمال بدائل الملح أو مكملات تحتوي على البوتاسيوم .
- في حالة وجود مشاكل كلوية أو كبدية شديدة .
- في حالة انخفاض الدورة الدموية في القلب أو تضيق أو الشريان الأبري (تضيق الفصام الأبري) أو في الشريان الكلوي .
- في حالة وجود صدمة بعد قصور قلبي (صدمة قلبية).
- الأشخاص المسالمين أو المسكري إيكازيد® أقراص قليلة للقطع يمتلك تأثير على مفعول الأنسولين أو أي دواء مضاد لداء السكري .
- في حالة الغسيل الكلوي تم ذكر تفاعلات تحسسية عند الأشخاص الذين يستعملون أدوية مشابهة للإيكازيد®، أقراص قابلة للقطع، ويضعون لعليل كلوي عن طريق بعض الأغذية (دبال مومي ذو تنفق عالي اوفصادة LDL مع امتصاص سوافلت الكيستراتان) .
- استخدام أدوية مضادة لحساسية قرصات الحشرات .
- الأشخاص الذين يعانون من حسية الحمامية أو شبيهة الذئبة .

يجب إخبار الطبيب إذا كنت تشكين في وجود حمل (أوإمكانية ذلك حوث قريباً).
إيكازيد® أقراص قابلة للقطع غير منوصح به في بداية فترة الحمل ولا يجب استعماله بعد ثلاثة أشهر من الحمل لأنه يضر بالجنين.

لا يجب استعمال الأدوية التي تحتوي على البوتاسيوم في نفس فترة استعمال إيكازيد® أقراص قابلة للقطع إلا بعد استشارة الطبيب .
لا ينصح باستعمال إيكازيد® أقراص قابلة للقطع للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز أو نقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز أو الجلاكتوز (امراض وراثية نادرة).

في كل الحالات، اطلب تصاحب طبيبك الخاص قبل البدء في العلاج.
استشر الطبيب فوراً في حالة الشعور بأحد الأعراض التالية:

- انتفاخ الذراعين، الساقين، الكاحلين، الشفتين أو اللسان و/ أو الحلق مع صعوبة في البلع أو التنفس .
- علامات التنفخ(مثل ألم الحلق أو الحمى) التي لا تستجيب للعلاج الاعتيادي و يجب أن يتم تعداد خلايا الدم البيضاء.
- دوخة شديدة وفقدان الوعي .
- ألم شديدة في البطن .
- نبض غير طبيعي متسارع وغير منتظم .
- اصفرار العينين والجلد (اليرقان) .
- الأشخاص الذين يجب إخبارهم بأنك تستخدم إيكازيد® أقراص قابلة للقطع :
- الطاقم الطبي، خاصة الطبيب المخدر (في حالة التخللات الجراحية) لو كنت في المستشفى .
- طبيب الأسنان الخاص قبل التخدير لجراحة الأسنان .

- لو كنت تستعمل إيكازيد®، أقراص قابلة للقطع للمرة الأولى، سوف تشعر بالدوار والدوخة لمدة قصيرة لذلك ينصح بالجلوس أو الاستلقاء .
- هذه التأثيرات قد تقل في حالة استخدام إيكازيد® بشكل منتظم .
- في حالة الشك استشر طبيبك الخاص .

التداخلات الدوائية :

- إذا كنت تستعمل أو استعملت مؤخرا أي دواء خاصة تلك الأدوية التي يمكن الحصول عليها بدون وصفة طبية، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني بذلك.
- الأدوية التي يجب إخبار الطبيب أو الصيدلاني أيضا بها هي :
- أدوية ضد الحمى،المعال،الكاف، أو أي التهابات للجيوب الأنفية وذلك بسبب احتمال ارتفاع الضغط الشرياني
- مضادات الالتهاب التي تخفف أو تقضي على الألم (الستيرويدات القشرية).
- البنزوديازيبول (علاج الاضطرابات النفسية).
- كاربينيدولون(علاج الفرحة الحمضية).
- كورتيكوستيرويد، كورتيكوتروفين (ACTH)
- بعض المضادات .

- بعض المضادات الفطرية المستعملة عن طريق الحنف (امفوتريوسين).
- الأدوية المستخدمة لإزالة الحمضات(مستخدمة في الجراحة).
- كوليستيرامين، كوليستيول (لخفض نسبة الكوليستيرول).
- الأوبيرول(علاج داء الفرس).
- بروكينيدامد و جليكوزيدات مقوية للقلب مستعملة لعلاج النبض الغير منتظم .
- مثبطات الخلايا والمناعة (التيوتيرين و سيكلوفسفاميد).
- أملاح الكالسيوم .

- مكملات البوتاسيوم وبدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، مدرات البول (خاصة المنخولة للبوتاسيوم)
- أو أي دواء يؤدي إلى ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الجسم (مثل الهيبارين)،
- الأدوية التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية والمستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم (مينوكسيديل).
- كاربامازيبين(علاج الصرع) .
- أدوية مستعملة لعلاج داء السكري (الانسولين ومضادات داء السكري الفموية مثل سيلفونيل يوري).
- أدوية مستعملة لعلاج الاضطراب النفسية وبعض مضادات الاكتئاب القديمة أو كل الأدوية المخصصة لعلاج ارتفاع الضغط الشرياني .

الحمل والرضاعة :

لا ينصح باستخدام إيكازيد® خلال الثلثي الأول من الحمل.
عندما يكون الحمل مزمج أو مؤكد يجب استعمال علاج بديل.
لايستعمل إيكازيد® خلال الثلثي الثاني والثالث للحمل
استخدام إيكازيد® لفترات طويلة خلال الثلثي الثاني والثالث يؤدي إلى تسمم الجنين والمولود.

الرضاعة :

لا ينصح باستعمال إيكازيد® في حالة الولادة البكرة أو خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة. في حالة إرضاع طفل أكبر عمراً فإن طبيبك يعلمكم بفوائد وأخطار مواصلة استعمال إيكازيد®

استشر طبيبك الخاص أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

الأثار الجانبية :

- الأثار الجانبية المحتملة عند استخدام كابتوبريل و هيدروكلوروتيازيد هي كالتالي :
- فقدان الشهية، دوام، عدم وضوح الرؤية بشكل مؤقت .
- انخفاض ضغط الدم عند الوقوف، عدم انتظام ضربات القلب .
- سعال جاف و مهبج ، ضيق في التنفس .
- غثيان، فيء، التهابات المعدة، آلام في البطن، إسهال،إمساك، جفاف الفم ، التهاب في البنكرياس، برفان .
- حكة، حمض سوزني، طفح جلدي، تفاعلات التحبة الحمراء، خلايا النحل، رد فعل تحسسي، انحلال البشرة السمي .
- تشنجات عضلية .
- اختلال وظائف الكلى، التهاب الكلية الخلالي .
- حمى، وهن .
- فرط الحساسية، نقص الكريات البيضاء ، نقص الكريات الشاملة ، نقص الخلايا المتعادلة، نقص الحمضيات، نقص الصفائح، تضخم العقد اللمفاوية، فقر الدم الانحلالي فقر الدم اللاتسبي .
- فقدان الشهية، اختلال توازن الألكتروليتي .
- تبيح عصبي، اكتئاب، اضطرابات في النوم .

الإفراط في البرعي :

يرجى مراجعة الطبيب أو الصيدلاني فوراً في حالة استخدام جرعة زائدة بالخطأ.
يمكن حدوث الأثار التالية :

- التبول بشكل متكرر .
- تغيرات في بعض نبض مكونات الدم، انخفاض حاد في ضغط الدم الشرياني، نقص القدرة على استيعاب نفسك و ما يدور حولك (غيبوبة) ، اختلاجات، ضعف العضلات، نبض بطيء وغير منتظم، قصور في وظائف الكلى .
- إذا فرط شخص آخر في الجرعة وأغمى عليه، ألغى على الأرض مع رفع قدميه إلى الأعلى .

في حالة النسيان :

في حالة نسيان أخذ الجرعة اليومية، استمر في أخذ الجرعة التالية بشكل طبيعي كما وصفها لك طبيبك، لا تأخذ جرعة أخرى لتعويض الجرعة التي نسيته تناولها.

الرياضيون :

يرجى أخذ الحذر،الهيدروكلوروتيازيد الموجود في الدواء قد يعطي نتائج إيجابية عند القيام بفحص المنشطات .

سببقة المركبات واستخدام الألات :

تتضمن القدرة على سببقة المركبات واستخدام الألات في بداية استخدام العلاج ومع تغير الجرعة وشرب الكحول في نفس الفترة. وهذا يعتمد على الحساسية الفردية للمريض .

الحفظ :

- يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م.
- يحفظ في العبوة الأصلية.
- يحفظ بعيداً عن متناول و مرأى الأطفال.
- يحفظ بعيداً عن الرطوبة.
- تاريخ مراجعة النشرة : جانفي 2017
- رقم قرار التسجيل : 16/99/06E137/285

صاحب مقر التسجيل/الصانع/ المصني :
Union Pharmaceutique Constantinose
المنطقة الصناعية بالمنا حمصة رقم (1)، 25000 قسنطينة، الجزائر .

