

MADECOSID®

Poudre à 2%

Extrait de CENTELLA ASIATICA

FORME PHARMACEUTIQUE, PRESENTATION ET COMPOSITION :

Poudre de 2% - Flacon de 2 g

Principe actif : Asiaticoside (Triterpènes de Centella Asiatica)..... 2g

Excipients : Magnésium stéarate, talc..... q.s.p100 g de poudre

PROPRIETES :

La fraction totale Triterpénique de Centella asiatica exerce un effet marqué de modulation sur le développement du tissu connectif par une action directe aussi bien sur les fibroblastes que sur les deux acides aminés fondamentaux dans le métabolisme du collagène, la proline et l'alanine. On obtient ainsi une stimulation des processus de cicatrisation, une réépithélisation améliorée ainsi qu'une normalisation du tissu connectif périvasculaire. Tout ceci se reflète dans une réduction de la perméabilisation de l'endothélium vasculaire et dans un rétablissement de l'équilibre hémodynamique du système microvasculaire.

MADECOSID est dépourvu de toxicité, aussi bien chez l'adulte que chez les fœtus et il est bien toléré dans les traitements par voie épicutanée.

INDICATIONS :

Dans le traitement topique de l'ulcère variqueuse, des escarres, des brûlures d'origine différente; dans les retards de cicatrisation.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité vérifiée aux principes actifs du médicament, ou à l'un des excipients.

PRECAUTIONS :

Au cas où il y aurait des lésions, il faudra associer une thérapie antibactérienne.

Formes non adaptées à l'usage ophtalmique.

La poudre est particulièrement réservée aux lésions suintantes ; ne pas utiliser la poudre sur des plaies profondes.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

L'administration de MADECOSID est déconseillée pendant le premier trimestre de la grossesse, pendant les mois successifs sous prescription médicale directe.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

On ne connaît aucune interaction avec d'autres médicaments.

EFFETS SECONDAIRES :

Aucun effet secondaire n'a été signalé. Parfois après traitements prolongés, il peut se manifester une sensibilisation locale, telles que prurit, sensation de brûlures et éruption eczématiforme. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu, il faudra instaurer une thérapie substitutive.

POSOLOGIE :

Application de poudre selon les besoins, en général 1 ou 2 fois par jour.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer la poudre sur les lésions après désinfection et suivant le rythme des pansements.

SURDOSAGE :

Aucun cas de surdosage n'a été communiqué.

CONSERVATION :

Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.

Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.

N° Décision d'enregistrement : 18/07 A 001/285

Dernière date de révision : Mars 2018



Detenteur de la decision d'enregistrement/ fabricant/conditionneur:
UPC, Z.I. Palma lot. n°7A - 25000 Constantine Algérie

مديكوزيد[®]

مسحوق 2%

خلاصة سانتيلاسياتيكا

الشكل الصيدلاني، العرض و التركيب :

مسحوق 2% - قارورة 2 غ

المادة الفعالة: اسياتيكوزيد (تريتران من مستخلص سانتيلاسياتيكا)..... 2 غ
سواغات: ستيرات المغنيزيوم، طلق..... ك.ك.ل..... 100 غ من المسحوق

الخصائص

مجموع نسبة التريترينات من سانتيلاسياتيكا يمارس أثرا عميقا في تحسين و تسوية النسيج الضام المحيط بالأوعية بعمل مباشر سواء على الفيروبلات أو على إثنين من الأحماض الأمينية الأساسية في تشكيل الكولاجين، البرولين و الأئين. و هذا يحفز عملية الشفاء، تحسين و تطبيع رابط الأنسجة و الأوعية الدموية. كل هذا ينعكس في خفض قابلية نفاذ السوائل من الأوعية الدموية و في تحقيق توازن أفضل لنظام الأوعية الدموية. إن مديكوزيد غير سام، عند كل من البالغين و عند الجنين و جيد التحمل في العلاج على سطح الجلد.

دواعي الاستعمال:

في العلاج الموضوعي لقرحة الدوالي، تقرحات الفراش، حروق من أصول مختلفة و تأخر في إنتام الجروح.

موانع الاستعمال:

فرط الحساسية المؤكدة للمادة الفعالة ، أو لأحد السواغات.

الاحتياطات:

في حالة وجود إصابات، يجب إشراك علاج مضاد للبكتيريا.

هذا الشكل غير ملائم للاستخدام في العيون.

المسحوق مخصص للاستعمال في المناطق الرطبة من الجروح، لا يجب استعمال المسحوق على الجروح العميقة.

التداخلات الدوائية:

لا تعرف تداخلات مع أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة :

يجب تجنب استعمال مديكوزيد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، و خلال الأشهر المتتالية بموجب صفات طبية مباشرة.

الآثار الجانبية :

لم يذكر أي أثر جانبي، أحيانا بعد علاج لمدة طويلة، يمكن أن تحصل حساسية محلية مثل حكة، شعور بحرق، إكزما والطفح الجلدي. في هذه الحالة يجب إيقاف العلاج و إعطاء علاج بديل.

المقادير الصيدلانية:

تطبيق المسحوق حسب الحاجة، عادة 1 أو 2 مرات في اليوم.

طريقة الاستعمال:

تطبيق المسحوق على الإصابات بعد تطهيرها و حسب وتيرة التضميد.

الجرعة الزائدة:

لا توجد أي حالات للجرعات المفرطة قد تم الإبلاغ عنها.

الحفظ:

يحفظ بعيدا عن الضوء، في مكان معتدل و جاف.

لا يترك في متناول و مرأى الأطفال.

رقم مقرر التسجيل : 18/07 A 001/285

تاريخ مراجعة النشرة : مارس 2018

NOIMAD 231

صاحب قرار التسجيل/الصانع/المعبر : UPC المنطقة الصناعية بالما، حصة رقم 7 ، 25000 قسنطينة-الجزائر

