

•Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:

Carbocistéine 2 g
(100 mg par cuillère mesure)

Excipients: Parahydroxybenzoate de méthyle, hydroxyde de sodium, Saccharose, Excipient parfumée et colorée, eau purifiéeq.s.p.....100 ml.

1 cuillère-mesure de 5 ml contient 100 mg de carbocistéine, 3 g de saccharose, et 13 mg hydroxyde de sodium.

EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRE:

-Saccharose (3 g par cuillère-mesure).
-Parahydroxybenzoate de méthyle (E218).

FORME PHARMACEUTIQUE:

Sirup, flacon de 125 ml

PROPRIETES:

La Carbocistéine est mucolytique : elle diminue la viscosité pathologique du mucus, le fluidifie et permet donc son évacuation favorisant ainsi la guérison.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

Ce médicament est un fluidifiant des sécrétions bronchiques et facilite ainsi leur évacuation par la toux.

Ce médicament est préconisé dans les états d'encombrement des bronches en particulier lors des bronchites aiguës.

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT:

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants (notamment au parabène (parahydroxybenzoate de méthyle.) EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES:

UN AVIS MEDICAL EST NECESSAIRE:

- En cas d'expectoration grasse ou purulente, fièvre
- Si l'enfant est atteint d'une maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons;
- Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, prévenir votre médecin.

En cas de diabète ou de régime hypoglycémique (pauvre en sucre). Tenir compte de la teneur en saccharose (3 g par cuillère mesure).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT:

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre. Il est possible d'allaiter votre enfant en cas de traitement par ce médicament.

D'une façon générale, il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

EFFETS INDESIRABLES:

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

Possibilité de phénomènes d'intolérances digestives (gastralgies, nausées, diarrhées).

Il est conseillé de réduire la dose.

-En raison de présence de parabène (parahydroxybenzoates de méthyle), ce médicament peut provoquer de l'urticaire.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, ET EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT:

La posologie usuelle est:

CE MEDICAMENT EST CONTRE INDIQUE CHEZ L'ENFANT DE MOINS DE 2 ANS.

-**Enfants de 2 à 5 ans:** 1 cuillère-mesure de 5 ml 2 fois par jour.

-**Enfants de plus de 5 ans :** 1 cuillère-mesure de 5 ml 3 fois par jour.

Ce médicament vous a été personnellement délivré dans une situation précise:

- Il peut ne pas être adapté à un autre cas.
- Ne pas le conseiller à une autre personne.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

Voie orale.

DUREE DU TRAITEMENT:

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement sans avis médical.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

CONDITIONS DE CONSERVATION:

Ce médicament est à conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

N° DE: 08/20D041/285

رينولاكتول[®] 2%

شراب للصغار

125 مل

كاربوسستين

• اقرأ النشرة بتمعن، في حالة شك أو إستفسار، أطلب نصيحة من الصيدلي.

التكوين:

كاربوسستين 2غ
(ما يعادل 100 مغ لكل ملعقة قياس)

سواغ:

مثيل البراين (مادةحافظة)،سكاروز، عطر الموز، هيدروكسيد الصوديوم، ماء مطهر ك.ك.ل..... 100مل.

قائمة السواغات ذات مفعول مشهور:

-سكاروز (3غ لملعقة قياس)
-مثيل البراين (E 218).

العوبة:

زجاجة سعة 125 مل.
ملعقة قياس 5 مل تحتوي على 100 مغ من الكاربوسستين،
3 غ من السكاروز، و 13 مغ من هيدروكسيد الصوديوم.

الخصائص:

الكاربوسستين حال للمخاط:
إنه يقلل من لزوجه الإعتدالية و يبعده مما يسهل طرده و بالتالي يساعد على الشفاء.

ما هي الحالات التي يجب فيها استعمال هذا الدواء:

إن هذا الدواء يميع الإفرازات القصبية و يسهل الإفرازات عند السعال.

ما هي الحالات التي لا يجب فيها استعمال هذا الدواء:

يمنع إستعمال هذا الدواء في حالة وجود حساسية مسبقة لأحد المكونات خصوصاً البراين (مثيل البراين).
في حالة الشك، من الضروري إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة:

رأي الطبيب مطلوب عند:
-في حالة التقشع الدهني أو المتقيح، الحمى.
-إذا كان الطفل مصاباً بمرض مزمن (طويل المدى) للقصبات أو الرئتين.
-لا يؤخذ دواء مضاد للسعال أو دواء مجفف للإفرازات القصبية أثناء العلاج بهذا الدواء.

إحتياطات الإستعمال:

- في حالة وجود قرحة في المعدة أو الفج، استشر الطبيب.
- في حالة المعاناة من داء السكري أو الحمية لإنقاص السكر، يجب الأخذ بعين الإعتبار كمية السكاروز (3غ لكل ملعقة قياس)
- في حالة الشك، لا تتردد في استشارة طبيبك أو الصيدلي.

الحمل و الرضاعة:

لا يؤخذ الدواء أثناء الحمل إلا إذا أخذ رأي الطبيب. إذا اكتشف الحمل أثناء العلاج، استشر الطبيب لأنه الوحيد

الذي يقرر وجوب إتمام العلاج.
باستطاعتك إرضاع طفلك أثناء العلاج بهذا الدواء.
بصفة عامة، عند الحمل و الرضاعة، من الضروري دائماً أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي أثناء العلاج.

التأثيرات الجانبية الغير مرغوب فيها:

مثل كل مادة فعالة فإن هذا الدواء عند بعض الأشخاص يسبب تأثيرات نوعاً ما مزعجة.
- إمكانية حدوث إضطرابات في المعدة (غثيان، ألم في المعدة، إسهال)، في هذه الحالة، ينصح بتخفيف الجرعات.
إن وجود البراين (أملاح البراين) في هذا الدواء قد يسبب طفح.
يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن كل تأثير غير مرغوب فيه و مزعج غير مذكور في النشرة.

المقادير و طريقة الإستعمال:

المقادير الإعتيادية:

لا يستعمل لدى الأطفال الأقل من (2) سنتين.
الأطفال من سنتين(2) الى خمس (5) سنوات : ملعقة قياس 5 مل مرتين في اليوم.
الأطفال فوق الخمس سنوات: ملعقة قياس 5 مل ثلاث مرات في اليوم.

إن هذا الدواء وصف لك شخصياً في حالة محددة:
- لا يمكن أن يتناسب مع حالة أخرى
- لا يجب أن ينصح به لشخص آخر.

ما يجب القيام به عند مضاعفة المقادير:

إذا حصل و ضعفت المقادير، يجب إيقاف العلاج فوراً و استشارة الطبيب.

طريقة تناول هذا الدواء:

عن طريق الفم.

مدة العلاج:

لا يجب أن تتجاوز مدة العلاج ثمانية (8) إلى عشرة (10) أيام بدون أخذ رأي الطبيب.

التداخلات الإستطبابية:

لتفادي تداخلات دائية محتملة، يجب بانتظام إبلاغ طبيبك أو الصيدلي عن كل علاج آخر قيد التناول.

شروط الحفظ:

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من 25° درجة.
يجب عدم استعماله بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية المذكور بوضوح على العبوة.

رقم قرار التسجيل: 08/20D041/285

N03RNE

