

•Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

COMPOSITION:

Carbocistéine 5g
(750 mg par cuillère à soupe)

Excipients: Parahydroxybenzoate de méthyle (E128), Solution de saccharose, Hydroxyde de sodium, Arôme cerise, Eau purifiée q.s.p 100ml de sirop.

PRESENTATION:

Flacon de 150 ml

La Carbocistéine est mucolytique : elle diminue la viscosité pathologique du mucus, le fluidifie et permet donc son évacuation favorisant ainsi la guérison.

INDICATION THERAPEUTIQUES:

Ce médicament est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans) en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration (difficulté à rejeter en crachant les sécrétions bronchiques).

CONTRE INDICATIONS:

Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'antécédent d'allergie à l'un des constituants du sirop. EN CAS DE DOUTE, VOUS DEVEZ DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALS:

UN AVIS MEDICAL EST NECESSAIRE:

- En cas d'expectoration grasse et purulente de fièvre;
- Si vous êtes atteints d'une maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons;
- En cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

NE LAISSER PAS CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Ce médicament doit toujours être accompagné d'efforts volontaires de toux, permettant l'expectoration.

Ne pas prendre de médicament antitussif (destiné à calmer la toux) ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine. En cas de diabète ou de régime hypoglycémique (pauvre en sucre), tenir compte de la teneur en saccharose (8,8 g par cuillère à soupe). En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de la teneur en sodium (96 mg par cuillère à soupe).

IL EST IMPORTANT DE CONSULTER UN MEDECIN EN L'ABSENCE D'AMELIORATION.

EFFETS INDESIRABLES:

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

Possibilité de troubles digestifs : nausées,

Vomissements, diarrhées minuscule.

Il est conseillé dans ce cas de réduire la posologie.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT, ET EN PARTICULIER CEUX QUI NE SERAIENT PAS MENTIONNES DANS CETTE NOTICE.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

RESERVE AL'ADULTE (plus de 15 ans) 1 cuillère à soupe matin, midi et soir, en dehors des repas, sans dépasser 3 cuillères à soupe par jour.

1 cuillères à soupe = 15ml = 750 mg de carbocistéine.

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement.

CONDUIT A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:

En cas de surdosage accidentel, ARRETEZ LE TRAITEMENT ET CONSULTEZ RAPIDEMENT VOTRE MEDECIN.

INTERACTION MEDICAMENTEUSES:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Ce MEDICAMENT contient de la carbocistéine. D'autres médicaments en contiennent.

Ne les associer pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir mode d'emploi et posologie).

SI VOUS ETES ENCEINTE OU SI VOUS ALAITEZ:

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE DU MEDICAMENT PAR LE PATIENT:

- Saccharose.
- Hydroxyde de sodium.
- Parahydroxybenzoates de méthyle (E128).

CONDITIONS DE CONSERVATION:

- A conserver à l'abri de la chaleur.
- Ne pas dépasser la date limite d'utilisation indiquée en clair sur l'emballage.

N° DE: 08/20D042/285

• اقرأ النشرة بتمعن، في حالة شك أو إستفسار، أطلب نصيحة من الصيدلي.

التكبيك:

كاربوسستين 5 غ (ما يعادل 750 ملغ لكل ملعقة كبيرة)
 باراهيدروكسيبنزوات المثلث (E128)، محلول
 السكرورز، هيدروكسيد الصوديوم، عطر الكرز،
 ماء مطهر..... ك.ك.ل 100 مل شراب.

التقديم: زجاجة سعة 150 ملل

الكربوسستين حال للمخاط:
 إنه يقلل من لزوجه الإعتدالية و يميحه مما يسهل
 طرده و بالتالي يساعد على الشفاء.
 الكربوسستين منظم لإفراز المخاط: إنه يساعد على
 تجديد أفضل للأنسجة المخاطية المصابة.

دواعي الإستطباب:

إن هذا الدواء يعطي للكبار (أكثر من 15 سنة)
 في حالة إلتهاب الجهاز التنفسي مصحوبة بصعوبة
 الإفرازات المخاطية (صعوبة الإفرازات التنفسية).

موانع الإستعمال:

يمنع إستعمال هذا الدواء في حالة وجود حساسية
 مسبقة لأحد المكونات.
 في حالة الشك، من الضروري إستشارة الطبيب أو
 الصيدلي.

تحذيرات خاصة:

رأي الطبيب مطلوب :
 - في حالة التقشع الدهني أو المتقيح، الحمى.
 - إذا كنت تعاني من مرض مزمن (طويل المدى)
 للمسالك التنفسية و الرئتين.
 - في حالة وجود قرحة في المعدة أو العفج.
 لا يترك هذا الدواء في متناول أيدي الأطفال.

إحتياطات الإستعمال:

• إن استعمال هذا الدواء يكون دائماً مصحوباً بجهد
 إرادي للسعال يسهل عملية الإفراز.
 • لا يؤخذ دواء مضاد للسعال أو دواء مجفف
 لإفرازات القصيبة أثناء العلاج بهذا الدواء.
 • في حالة المعاناة من داء السكري أو الحمية لإنقاص
 السكر (فقر في السكر)،
 يجب الأخذ بعين الإعتبار كمية السكرورز (8.8 غ
 لكل ملعقة كبيرة)

شروط حفظ الدواء:

• يحفظ بعيداً عن الحرارة.
 • يجب عدم استعماله بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية
 المذكور بوضوح على العبوة.

رقم التسجيل بالجزائر: 08/20D042/285

التأثيرات الجانبية:

مثل كل مادة فعالة فإن هذا الدواء عند بعض