30 قرص مخلف

يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل تناول الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.

نفظي بهذه النشرة، قد تحتاجين لقراءتها مرة أخرى.

. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، اسألي طبيبك أو الصيدلي.

. تم وصف هذا الدواء لك شخصيا. لا تعطيه لأشخاص آخرين، حتى لو كانت أعراضهم مماثلة لأعراضك. مكن أن يكون ضارالهم.

إذا واجهت أي آثار جانبية، تحدثي مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة . ينطبق هذا أيضا على أي آثار جانبية غير مرغوب فيها لم تذكر في هذه. النشرة . أنظري القسم4

ماهو ليتروزول UPC ®وما هي دواعي استخدامه؟

القسم الصيدلاني العلاجي: مضاد للسطان

ما هو ليتروزول UPC $^\circ$ و كيف يعمل ؟

بحتوي ليتروزول UPC ® على مادة فعالة تسمى ليتروزول . ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى موانع " الأروماتاز. وهو علاج هرموني (أو "الغدد الصماء") لسرطان الثدي. غالبا ما يتم تحفيز انتشار سرطان الثدي عن طريق الاستروجيــن ، وهــو هرمونِ الجنــس الأنثــوي. يقـــللُ ليتروزول UPC ® من مستويات هرمـــون الاستروجين عن طريق تثبيط إنزيم ("أروماتاز") التي تشارك في تركيب الأستروجيـن ويمكـن أن تمنـع نمـو سرطان الثدي التي تتطلب الاستروجين للتطور. ونتيجة لذلك ، فإن تكاثر الخلايا الورمية و / أو تمددها إلى أجزاء أخرى من الجسم يتباطأ أو يتوقف.

في أي حالة يتم استعمال ليتروزول UPC°؟

تتُخدم ليتروزُول UPC ° لعلاج سرطان الثدي عند النساء بعد سن اليأس ، وهذا يعني ، اللواتي لم يعد لديهن

بستخدم ليتروزول UPC ّلتوقي عودة ظهور سرطان الثدي. يمكن استخدامه كعلاج أولي عندما تكون الجراحة الفورية غير كافية أو يمكن استخدامه كعلاج أولي بعد جراحة الثدي أو بعد خمس سنوات من العلاج بالتاموكسيفين. يستخدم ليتروزول UPC ° أيضًا لمنع الورم من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم للمرضى الذين يعانون من سرطان الثدي في حالة متقدمة.

إذا كانت لديك أسئلة حول كيفية عمل ليتروزول UPC® أو سبب وصفه لك ، اطلبي من طبيبك مزيدًا من

. ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول ليتروزول UPC ؟ . ما الذي يجب عليك معرفته قبل تناول ليتروزول تبعي تعليمات الطبيب بعناية. قد تختلف هذه المعلومات عن المعلومات العامة المقدمة في هذه النشرة.

لا تتناولي ليتروزول UPC °: " إذا كنت تعانين من حساسية من ليتروزول أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في القسم 6

* في حال عدم انقطاع الدورة الشهرية، أي إذا لم تصلي إلى مرحلة انقطاع الطمث بعد.

اذا كنت حاملاً.

* إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية.

ً، إذا كان لديكٌ أي من هذه الشروط، لا تأخذي هذا الدواء وتحدثي مع طبيبك. . تحذيرات واحتياطات الاستعمال:

تحدثي إلى طبيبك أو الصيدلي قبل تناول ليتروزول UPC °:

"إذا كان لديك مرض شديد في الكلى ،

* إذا كنت تعانين من مرض كبدي حاد،

. • إذا عانيت في الماضي من مرض هشّاشة العظام أو كسور العظام (انظري أيضًا القسم 3 "المراقبة أثناء العلاج باستخدام ليتروزول CPU°"

إذا كان لديك أي من هذه الأمراض، تحدثي إلى طبيبك. سيأخذ طبيبك ذلك بعين الاعتبار أثناء العلاج

ب ليتروزول UPC

يحتوي ليتروزول UPC " على اللاكتوز يحتوي ليتروزول UPC °على اللاكتوز. لا ينصح إستخدام هذا الدواء لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل

الجالاكتوز، نقص في اللاكتاز لاب أو متلازمة ً سوء إمتصاص الجلوكوز أو الجالاكتوز (مرض وراثي نادر). الأطفال والمراهقون :

لا ينبغي استعمال هذا الدواء للأطفال أو المراهقين.

كبار السن (65 سنة فما فوق) بمكن استخدام هذا الدواء للمرضى البالغين ابتداءا من 65 سنة فما فوق بنفس الجرعة بالنسبة للبالغين

أدوية أخرى وليتروزول UPC ":

أخبري طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناولين أو تناولت مؤخرا، أو قد تتناولين أي أدوية أخرى ما في ذلك

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

الحمل، الرضاعة والخصوبة

"يمكنك تناول ليتروزول UPC "فقط إذا كنت في سن اليأس. ومع ذلك ، قد يناقش طبيبك الحاجة إلى

استخدام وسائل منع الحمل الفعالة ، مع العلم أنك قد تكونين في سن يسمح لك بالإنجاب أثناء العلاج ب ليتروزول UPC °

"من غير المسموح تناول ليتروزول UPC ® في حالة الحمل أو الرضاعة الطبيعية ، لأنه يمكن أن يكون ضارًا لطفلك. القيادة واستخدام الآلات:

إذا شعرت بالدوار أو التعب أو النعاس أو الشعور بعدم الارتياح، لا تقودي السيارة أو تشغلي الآلات حتى نشعري بالارتياح مرة أخرى.

3 .كيفية تناول ليتروزول UPC °؟ احرصي دامًّا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك الطبيب أو الصيدلي. تحققي مع طبيبك أو الصيدلي في حال

الجرعة المعتادة من ليتروزول UPC هي قرص واحد في اليوم. تناول ليتروزول UPC في نفس الوقت يوميا

سوف يساعدك على تذكر تناول القرص. يجب بلع القرص بأكمله مع كوب من الماء أو سائل آخر، أثناء أو خارج الوجبات.

مدة تناول ليتروزول UPC ° ؟

استمري في تناول ليتروزول UPC ° كل يوم طالما وصف الطبيب ذلك. قد تتمكنين من أخذه لعدة أشهر أو

متى سنوات. إذا كانت لديك أسئلة حول مدة علاجك ب ليتروزول UPC® ، تحدثي إلى طبيبك. المراقبة أثناء العلاج ب ليتروزول UPC

لا يتناول هذا الدواء إلا تحت المراقبة الطبية الصارمة. سيقوم طبيبك بمراقبة حالتك بانتظام لتحديد ما إذا

كان العلاج قد حقق الآثار المتوقعة. - - . قد يسبب ليتروزول UPC ° ترقق أو تخلخـل العظـام (هشاشة العظام) بسبـب انخفـاض هرمون الاستروجيـن في

الجسم. قد يقرر الطبيب قياس كثافة عظامك (طريقة لمراقبة هشاشة العظام) قبل ، أثناء وبعد العلاج. . . `` إذا كنت تأخّذيّن ليتروزول UPC ® أكثر مما ينبغ

. إذا تناولت الكثير من الدواء، أو إذا قام شخص آخر بأخذ أقراصك عن طريق الخطأ ، فعليك طلب المشورة الفورية من طبيبك أو المستشفى. مع إحضار صفيحة الدواء. قد يكون العلاج الطبي ضروريًا.

إذا نسيت أن تتناولي ليتروزول UPC °

* إذا تذكرت نسيانك للجرعة في وقت قريب من الجرعة الموالية (على سبيل المثال قبل ساعتين أو 3 ساعات ، من تناول الجرعة الموالية) ، لا تأخذي الجرعة التي فاتتك و تناولي الجرعة الموالية في الوقت المعتاد.

* إذا لم يكن الأمر كذلك ، تناولي الجرعة بمجرد تذكرها ثم تناولي الأقراص الموالية كالمعتاد. * لا تأخذي جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت تناولها. إذا توقفت عن تناول ليتروزول UPC®

لا يجب عليك التوقف عن تناوله إلا إذا أخبرك الطبيب بذلك.

« انظري القسم أعلاه مدة تناول ليتروزول UPC $^{\circ}$ ؟»

4 .ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميُّع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع . معظم الآكار الجانبية خفيفة إلى معتدلة وتختفي عادة بعد بضعة أيام إلى بضعة أسابيع من العلاج. بعض منها ، مثل الهبات الساخنة ، وفقدان الشعر أو نزيف المهبل ، قد يكون بسبب نقص الأستروجين في الجس لا تنزعجي من قائمة هذه الآثار الجانبية المحتملة. قد لا تحدث لك. بعض الآثار الجانبية يمكن أن تكون خطيرة:

*ألم مفاجئ في الصدر (علامة على وجود مشكلة في القلب).

غير شائعة (قد يؤثر على 1 من كل 100 مريض): "الضعف، شلل أو فقدان الحساسية في أي جزء من الجسم (خاصة الذراعين أو الساقين) ، فقدان التنسيق، الغثيان، أو صعوبة في الكلام أو التنفس (علامات اضطراب الدماغ ، مثل السكتة الدماغية).

* ارتفاع ملموس في درجة الحرارة، قشعريرة أو تقرحات الفم بسبب العدوى (نقص خلايا الدم البيضاء).

صعوبة التنفس ، ألم في الصدر ، إغماء ، تسارع ضربات القلب ، لون مزرق للبشرة أو ألم مفاجئ في الذراع

. يجب عليك إخبار طبيبك على الفور إذا كنت تعانين من أي من الآثار الجانبية خلال فترة العلاج ب ليتروزول UPC°:

* طفح جلدي ، احمرار في البشرة ، بثور على الشفتين ، العينين أو الفم ، تقشر البشرة ، حمى (علامات

بعض الآثار الجانبية شائعة جدا(قد تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 مرضى): . * المات الساخنة. * زيادة في نسبة الكولسترول (فرط كولسترول الدم).

. * تورم واحمرار على طول الوريد وهو حساس للغاية وربما مؤلم عند اللمس.

* التعرق المفرط. * ألم العظام والمفاصل (ألم مفصلي).

إذا كان أى من الآثار الجانبية المذَّكورة خطيرة، يرجى إخبار طبيبك.

. بعض الآثار الجانبية شائعة (قد تؤثر على 1 من كل 10 مرضى):

ً طفح جلدي. * صداع.

*عدم الارتياح (الشعور بالقلق).

دوخة.

اضطراب مستمر في الرؤية .

ا اضط ابات الحلد).

نادر (قد يؤثر على مريض واحد من1000)

أو الساق أو القدم (علامات تجلط الدم المحتمل).

إذا كنت تواجهين أيًا مما سبق، أخبري طبيبك على الفور.

* اضطرابات الجهاز الهضمي مثل: الغثيان، القيء ، صعوبة الهضم ، الإمساك ، الإسهال. * زيادة أو فقدان الشهية.

ألم العضلات. * ترفق العظام أو تخلخل العظام (هشاشة العظام) التي يمكن أن تؤدي إلى كسور العظام في بعض الحالات

(انظري أيضًا القسم 3 المراقبة أثناء العلاج باستخدام ليتروزول UPC "). * تورم الذراعين واليدين والقدمين أو الكاحلين (الوذمة).

* الاكتئاب. * زيادة الوزن.

* تساقط الشعر

* زيادة ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم). * ألم في البطن.

* حفاف البشرة. * نزیف مهبلي.

* الخفقان، تسارع معدل ضربات القلب.

* تصلب المفاصل (التهاب المفاصل).

* ألم في الصدر. إذا لاصطت خطورة أي من الآثار الجانبية المذكورة، يرجى إخبار طبيبك.

الآثار الجانبية الأخرى غير الشائعة (قد تؤثر على 1 من كل 100 مريض): * الاضطرابات العصبية مثل :القلق، العصبية، التهيج، النوم، مشاكل في الذاكرة، النعاس ،الأرق.

* ألم أو الشعور بحروق في اليد أو الرسغ(متلازمة النفق الرسغي).

* تغير الأحاسيس، وخاصة اللمس.

" اضطرابات العين مثل: عدم وضوح الرؤية ،تهيج العين.

* اضطرابات البشرة مثل: الحكة (طَفْح جلدي). * تدفق أو حفاف المهيل.

* ألم الثدي.

* العطش، تغيير المذاق، جفاف الفم.

و جفاف الأغشية المخاطية.

* خسارة الوزن.

* الالتهاب البولي ، زيادة تواتر انبعاثات البول. * السعال.

و زيادة في معدل إنزيمات الكبد.

* اصفرار البشرة والعيون.

"زيادة مستويات الدم من البيليروبين (مادة ناتجة عن انحلال كريات الدم الحمراء). الآثار غير المرغوب فيها بتردد غير معروف (لا يمكن تقدير التردد بنا ء على البيانات المتاحة):

الأصابع الزنادية ، وهو مرض يبرز من خلال تثبيت إصبعك أو إبهامك في الوضع المنطوي. إذا كان أي من الآثار الجانبية التي تلاحظينها خطيرة ، يرجى إخبار طبيبك.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية إذا لاحظت أي آثار جانبية، تحدثي مع طبيبك أو الصيدلي أو الممرضة. هذا ينطبق أيضا على أي تأثير غير مرغوب فيه لم يرد ذكره في هذه النشرة.

ن خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المساعدة في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

 كيف يتم حفظ ليتروزول UPC [®] ? يحفظ بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال.

لا تستخدمي هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على الغلاف الخارجي. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى آخر يوم في الشهر المذكور.

يحفظ عند درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية. يتم الحفظ في العلبة الأصلية، بعيدا عن الرطوبة.

. لا تستخدمي هذا الدواء في حالة تلف العلبة أو إذا لاحظت أي علامة من علامات التزييف. 6. محتويات الغلاف ومعلومات أخرى:

على ما يحتوي ليتروزول UPC°

التركسة:

لىتروزول.. ك.ك.لقرص مغلف واحد سەاغات.

سواغات ذات تأثير ملحوظ: لاكتوز أحادي التمييه.....

ال**مكونات الأُخرى:** ثاني أكسيد السيليكا الغروية غير المميه ، سليلوز ميكروكريستالين، كروسكارميلوز الصوديوم ، ستيرات المغنيزيوم، أوبادراي أصفر (تغطية).

ما هو ليتروزول UPC ° و محتوى الغلاف الخارجي: ليتروزول UPC هو عبارة عن أقراص مغلفة.

كل علبة تحتوي على صفيحتين و كل صفيحة تحتوي على 15 قرص مغلف. رقم مقرر التسجيل: 20/09A120/285

ناريخ مراجعة النشرة: فيفري 2019.

القائمة I

صاحب مقرر التسجيل /الصانع/ المعبئ: UPC ،المنطقة الصناعية بالما، حصة رقم 7 أ ، 25000 قسنطينة - الجزائر

LETROZOLE UPC ®

Letrozole 30 comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes

pour vous.
Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien qui votre infirmier/ère. Ceci (c'applique

médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

1. QU'EST-CE QUE LETROZOLE UPC° ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
Classe pharmacothérapeutique :
Anti cancéreux.
Qu'est-ce que LETROZOLE UPC° et comment agit-il ?
LETROZOLE UPC° entient une substance active appelée létrozole. Il appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'aromatase. C'est un traitement hormonal (ou « endocrinien ») du cancer du sein. La prolifération du cancer du sein est souvent stimulée par les oestrogènes, qui sont des hormones sexuelles féminines. LETROZOLE UPC° diminue le taux d'oestrogènes en inhibant une enzyme (« aromatase ») impliquée dans la synthèse d'oestrogènes en inhibant une enzyme (« aromatase ») impliquée dans la synthèse d'oestrogènes en pourrait ainsi empêcher la croissance des cancers du sein qui ont besoin d'oestrogènes pour se développer. En conséquence, la prolifération et/ou l'extension des cellules tumorales à d'autres parties de lorganisme est ralentie ou arrêtée.

Dans quel cas LETROZOLE UPC° est-il utilisé ?
LETROZOLE UPC° est utilisé pour traiter le cancer du sein chez les femmes ménopausées, c'est-à dire qui n'ont plus de règles.
LETROZOLE UPC° est utilisé pour prévenir les récidives de cancer du sein. Il peut être utilisé en traitement de première intention lorsqu'une chirurgie immédiate n'est pas adéquate ou il peut être utilisé en traitement de première intention après une chirurgie mammaire ou après cinq ans de traitement par le tamoxifène.
LETROZOLE UPC° est également utilisé pour empêcher la tumeur de s'étendre à d'autres parties du corps chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade avancé.

d'autres parties du corps chez les patientes atteintes d'un cancer du sein à un stade avancé.

Si vous avez des questions sur la manière dont LETROZOLE UPC° agit ou sur la raison pour laquelle ce médicament vous a été prescrit, demandez plus d'informations à votre médecin.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LETROZOLE UPC°?

Respectez attentivement l'intégralité des instructions du médecin. Celles-ci peuvent être différentes des informations générales présentées dans cette notice.

Ne prenez jamais LETROZOLE UPC°:

* si vous êtes allergique au létrozole ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

* si vous avez toujours vos règles, c'est-à-dire si vous n'êtes pas encore ménopausée,

* si vous êtes enceinte,

* si vous allaitez.

si vous allaitez.

* si vous allaitez.
Si vous présentez l'une de ces conditions, ne prenez pas ce médicament et parlez-en à votre médecin.
Mises en garde et précautions d'emploi:
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LETROZOLE UPC*:
* si vous présentez une maladie rénale sévère,
* si vous présentez une maladie hépatique sévère,
* si vous présentez des antécédents d'ostéoporose ou de fractures osseuses (voir également rubrique 3 « Surveillance pendant le traitement par LETROZOLE UPC*»).

UPC**»).
Si vous présentez l'une de ces conditions, parlez-en à votre médecin. Votre médecin la prendra en compte pendant votre traitement par LETROZOLE UPC*.

LETROZOLE UPC* contient du lactose:

LETROZOLE UPC* contient du lactose. son utilisation est déconseillé chez les patients présentants une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

patients présentants une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

Enfants et adolescents:
Ce médicament ne doit pas être utilisé chez les enfants ou les adolescents.
Personnes âgées (65 ans et plus):
Ce médicament peut être utilisé chez les patientes âgées de 65 ans et plus, à la même dose que pour les autres adultes.
Autres médicament set LETROZOLE UPC*:
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament y compris les médicaments sans ordonnance.

Grossesse, allaitement et fertilité:

* Yous ne pouvez prendre LETROZOLE UPC* que si vous êtes ménopausée. Toute fois, votre médecin pourra discruter avec vous de la nécessité d'utiliser une contraception efficace, sachant que vous pourriez encore être en âge de procréer pendant le traitement par LETROZOLE UPC* que si vous êtes ménopausée. Toute fois, votre médecin pourra discruter avec vous de la nécessité d'utiliser une contraception efficace, sachant que vous pourriez encore être en âge de procréer pendant le traitement par LETROZOLE UPC* s' LETROZOLE UPC* ou contre-indiqué en cas de grossesse ou d'allaitement, car cela pourrait être nocif pour votre enfant.

Conduite de véhicules et utilisation de machines:
Si vous ressentez des vertiges, une fatigue, une somnolence ou une sensation de malaise géréral, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines jusqu'à ce que vous vous sentiez de nouveau bien.

3. COMMENT PRENDRE LETROZOLE UPC*?

Veuillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose habituelle est un comprimé de LETROZOLE UPC* par jour. Prendre LETROZOLE UPC* à la même heure chaque jour vous aidera à ne pas oublier de prendre votre comprimé.

Le comprimé doit être avalé entier avec un verre d'eau ou un autre liquide, au cours ou ne dehors des repas.

Combien de te

voil egidement la labrique di dessa.

Verent de la labrique di dessa de la labrique de labrique de labrique de labrique de labrique de labrique de la labrique de la labrique de la labrique de labrique de labrique de

indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart des effets indésirables sont d'intensité légère à modérée et disparaissent généralement après quelques jours à quelques semaines de

disparaissent généralement après quelques jours à quelques semaines de traitement.

Certains d'entre eux, tels que les bouffées de chaleur, la perte de cheveux ou les saignements vaginaux, peuvent être dus au manque d'oestrogènes dans l'organisme.

Ne soyez pas alarmée par cette liste d'effets indésirables éventuels. Il est possible

Ne soyez pas alarmée par cette liste d'effets indésirables éventuels. Il est possible que vous rien présentiez aucun.

Certains effets indésirables peuvent être graves:

Peu fréquents (peuvent concerner jusqu'à 1 patiente sur 100):

* Faiblesse, paralysie ou perte de sensibilité dans toute les parties du corps (plus particulièrement les bras ou les jambes), perte de coordination, nausées ou difficultés d'élocution ou à respirer (signes de troubles cérébraux, par exemple d'accident vasculaire cérébral).

* Douleur thoracique oppressante soudaine (signe de troubles cardiaques).

* Gonflement et rougeur le long d'une veine qui est très sensible et éventuellement douloureuse au toucher.

*Gonflement et rougeur le long d'une veine qui est très sensible et éventuellement douloureuse au toucher.

* Forte fièvre, frissons ou aphtes buccaux dus à des infections (manque de globules blancs).

* Troubles de vision sévères persistants.

Rares (peuvent concerner jusqu'à 1 patiente sur 1000):

* Difficultés à respirer, douleur thoracique, évanouissements, accélération du rythme cardiaque, coloration bleuâtre de la peau ou douleur soudaine dans un bras, une jambe ou un pied (signes d'une possible formation d'un caillot sanguin).

Si vous présentez l'un des effets ci-dessus, informez immédiatement votre médecin

Si vous présentez l'un des effets ci-dessus, informez immédiatement votre médecin.

Vous devez informer immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des effets indésirables au cours de votre traitement par LETROZOLE UPC*:

**Gonflement du visage et du cou (signes d'une réaction allergique).

**Yeux et peau jaune, nausées, perte d'appétit, urines foncées (signes d'hépatite).

**Eruption, rougeur de la peau, cloques sur les lèvres, les yeux ou la bouche, peau qui pèle, fièvre (signes de troubles de la peau).

**Certains effets indésirables sont très fréquents (peuvent concerner plus d'1 patiente sur 10):

**Bouffées de chaleur.

**Augmentation du taux de cholestérol (hypercholestérolémie).

**Fatique.

" Iranspiration excessive.

* Douleurs osseuses et articulaires (arthralgies).
Si vous ressentez un des effets mentionnés et qu'il vous paraît grave, veuillez-en informer votre médecin.
Certains effets indésirables sont fréquents (peuvent concerner jusqu'à 1 patiente sur 10):
Eruption cultanée

Eruption cutanée.
Maux de tête.

Maux de tete.

* Vertiges.

* Malaise (sensation générale de ne pas se sentir bien).

* Troubles digestifs, tels que nausées, vomissements, indigestion, constipation, diarrhées.

* Augmentation ou perte de l'appétit.

* Doubleurs musculaires.

* Douleurs musculaires.
* Amincissement des os ou fragilisation osseuse (ostéoporose) pouvant entraîner dans certains cas des fractures osseuses (voir également rubrique 3 Surveillance pendant le traitement par LETROZOLE UPC*).
*Gonflement des bras, des mains, des pieds ou des chevilles (œdème).
*Dépression.
* Prise de poids.
* Perte de cheveux.
* Augmentation de la pression artérielle (hypertension).
* Douleurs abdominales.
* Peau sèche.

Peau sèche.

* Peau séche.

* Saignement vaginal.

* Palpitations, accélération du rythme cardiaque.

* Raideur articulaire (arthrite).

* Douleurs thoracique.

Si vous ressentez un des effets mentionnés et qu'il vous paraît grave, veuillez-en informer votre médecin.

Informer votre medecin.

D'autres effets indésirables sont peu fréquents (peuvent concerner jusqu'à 1
patiente sur 100):

*Troubles nerveux, tels qu'anxiété, nervosité, irritabilité, assoupissement, troubles de la mémoire, somnolence, insomnie.

*Douleur ou sensation de brûlure au niveau de la main ou du poignet (syndrome de la mean la main ou du poignet).

du canal carpien).

* Altération des sensations, notamment du toucher.

Troubles oculaires, tels que vision trouble, irritation oculaire. Troubles cutanés, tels que démangeaisons (urticaire). Pertes ou sécheresse vaginale. Douleurs du sein.

Fièvre. Soif, altération du goût, bouche sèche.

Sécheresse des muqueuses.

Perte de poids.

Infection urinaire, augmentation de la fréquence des émissions d'urines.

Infection urnaire, augmentation de la frequence des critissions à difficult.

Augmentation du taux des enzymes hépatiques.

Jaunissement de la peau et des yeux.

Augmentation des taux sanguins de bilirubine (un produit de dégradation des labbiles gruppes)

* Augmentation des taux sanguins de bilirubine (un produit de dégradation des globules rouges).

Effets indésirables de fréquence indéterminée (la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles):

Doigt à ressaut, une pathologie qui se manifeste par un blocage de votre doigt ou de votre pouce en position fléchie.

Si vous ressentez un des effets mentionnés et qu'il vous paraît grave, veuillez-en informer votre médecin.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin.

microcristalline Croscarmellose sodique, Stéarate de magnésium ,Opadry jaune (pelliculage).

Qu'est-ce que LETROZOLE UPC° et contenu de l'emballage extérieur LETROZOLE UPC° se présente sous la forme de comprimés pelliculés. Chaque boite contient deux blisters et chaque blister contient 15 comprimés pelliculés.

DE N°:20/09A120/285 Liste I

La date de la dernière révision est : Février 2019

Détenteur de la décision d'enregistrement/ Fabricant / Conditionneur : UPC, Zone Industrielle Palma, lot N° 7A , 25000 Constantine –Algérie.

