

! Ce médicament est une spécialité d'automédication qui peut être utilisé sans consultation ni prescription médicale.

- **Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**
- Elle contient des informations importantes pour votre traitement
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:

Hexétidine 0,100g pour 100ml.
Excipients: QSP 100 ml.

EXCIPIENTS:

Polysorbate 60, saccharine sodique, sacilylate de méthyle, huile essentielle de girofle, menthol, huile essentielle d'anis, huile essentielle de menthe poivrée, huile essentielle d'eucalyptus, azorubine 85% (E 122), acide citrique monohydraté, éthanol à 96°, eau purifiée.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRES:

Ethanol 96°, Azorubine (E122)

FORME PHARMACEUTIQUE:

Solution pour bain de bouche

DETENUEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT ET FABRICANT:

UPC Z.I. LE RHUMEL n° 49, Constantine Algérie.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES:

Traitement local d'appoint des affections de la bouche, et soins postopératoires en stomatologie.

POSOLOGIE ET VOIE D'ADMINISTRATION:

Utilisation locale en bain de bouche.
Ne pas avaler ce produit.
Oralvex s'emploie pur ou dilué en bains de bouche 2 à 3 fois par jour :
• Pur une cuillère à soupe
• Dilué : à utiliser s'il apparaît des manifestations douloureuses. Verser une cuillère à soupe d'Oralvex dans un verre d'eau.

CONTRE INDICATIONS:

-Allergie connue à l'un des constituants
-Enfant de moins de 6 ans.
EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDES SPÉCIALES:

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (Azorubine E122) et peut provoquer des réactions allergiques.
Ce médicament contient de faibles quantités d'éthanol, Inférieures à 100 mg par bain de bouche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

L'usage prolongé (plus de 10 jours) n'est pas souhaitable car il peut modifier l'équilibre microbien naturel de la bouche

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS:

VEUILLEZ INDIQUER A VOTRE MÉDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, MEME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

GROSSESSE-ALLAITEMENT:

Allaitement

En cas d'allaitement il est préférable de ne pas utiliser ce médicament.
D'UNE MANIERE GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

DURÉE DU TRAITEMENT:

La durée du traitement est limitée à 10 jours.

EFFETS NON SOUHAITES ET GÊNANTS:

COMME TOUT MÉDICAMENT, ORALVEX PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS.
SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDÉSIRABLES NON MENTIONNES SUR CETTE NOTICE, VEUILLEZ INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

Un surdosage n'est pas attendu dans les conditions normales d'utilisation. Certains constituants peuvent entrainer, à doses excessives, des accidents neurologiques à type de convulsion chez l'enfant.
Respecter les posologies et la durée de traitement préconisées.

CONSERVATION:

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C.
Conserver le flacon dans son emballage extérieur, à l'abri de la lumière.

DE N° : 18/12/23 B 012/285

Date de mise à jour du texte: Novembre 2018

- اقرأ بإمعان هذه النشرة قبل استعمال هذا الدواء.
- احتفظ بهذه النشرة، قد تكون بحاجة لإعادة قراءتها.
- إذا كان لك أسئلة أو شك، أطلب توضيحات لطبيبك أو الصيدلاني.
- هذا الدواء وصف لك شخصيا، لا تعطيه لشخص آخر و لو تشابهت الأعراض، قد يضره.

التركيبة الكمية والنوعية:

هكسيتيدين 0.100 غ لكل 100 مل
سواغات: ك.ك.ل.....100مل

هذا الدواء يحتوي على كميات صغيرة من الإثانول، أقل من 100مغ من كل محلول لتطهير الفم.

إحتياطات الإستعمال:

يوضع بعيدا عن متناول الأطفال.
الإستخدام المطول (أكثر من 10 أيام) غير مرغوب فيه حيث أنه يغير من التوازن الميكروبي الطبيعي للفم.

تفاعلات دوائية و تفاعلات أخرى:

عليكم إشعار الطبيب أو الصيدلاني بأخذكم أنيا أو سالفا لدواء آخر، حتى لو كان هذا الدواء قد أخذ بدون وصفة.

الحمل و الرضاعة:

الرضاعة:
- أخذ هذا الدواء أثناء الرضاعة غير مرغوب فيه.
- أثناء الرضاعة و الحمل لابد من إستشارة الطبيب أو الصيدلاني.

مدة الإستعمال: محددة الى 10 أيام

التأثيرات الغير المرغوب فيها:

ككل دواء أورالفكس يمكن أن يسبب عند بعض الأشخاص تأثيرات غير مرغوب فيها.
إذا لاحظتم تأثيرات غير مرغوب فيها غير مذكورة في هذه النشرة أخبروا طبيبيكم أو الصيدلاني.

الواجب عمله في حالة زيادة في الجرعات:

زيادة الجرعات لا يكون في حالات الإستعمال العادية المضبوطة، بعض المكونات قد تتسبب في حالة الجرعات العالية، في إضطرابات عصبية عند الطفل.
يجب إحترام الجرعات و مدة العلاج الموصوفة.

الحفظ:

يحفظ في مكان درجة حرارته لا تتعدى 25°م.
يحفظ بعيدا عن الضوء عند إخراج الدواء من العلبة.
تحفظ القارورة في العلبة، بعيدا عن الضوء.

رقم قرار التسجيل: 18/12/23 B 012/285

تاريخ مراجعة النص: نوفمبر 2018

السواغات:

-متعدد السوربات 60، سكارين الصودي، ساليسيلات الميثيل، زيت أساسي للقرنفل، منثول، زيت أساسي للينسون، زيت أساسي للنعناع الحار، زيت أساسي للكالتوس، الأزوروبين 85% (E122)، حمض السيتريك أحادي الهيدرات، الإيثانول 96°، ماء منقى.

قائمة السواغات ذات التأثير الملحوظ :

الإثانول 96° ، أزوروبين (E 122).

الشكل الصيدلاني:

محلول لتطهير الفم.

صاحب التسجيل/الصانع: UPC، المنطقة الصناعية الرمال رقم 49 قسنطينة الجزائر.

إرشادات علاجية:

علاج فعال موقعي للتعفنات الفمية (الفاهية) و الرعاية بعد العمليات الجراحية في طب الأسنان.

طريقة الإستعمال :

- إستعمال موضعي كغسول للفم .
- لا يبلع هذا الدواء
- أورالفكس يستعمل خالص أو مخفف مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
- خالص: 1 ملعقة أكل.
- مخفف: يستعمل في حالة ظهور حالات التآلم أسكبوا ملعقة أكل من أورالفكس في كوب ماء .

موانع الإستعمال:

- حساسية معروفة لأحد مكونات هذا المطهر.
- طفل بعمر أقل من 6 سنوات.
- في حالة الشك من الأفضل أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات خاصة:

هذا الدواء يحتوي على ملون آزويك أزوروبين (E 122) الذي قد يتسبب في الحساسية.