

ATUSSINE® ADULTES

BROMHYDRATE DE DEXTROMETHORPHANE/MALEATE DE MEPYRAMINE

Sirop 0.2g/0.2g/100ml

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**  
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.  
• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.  
• Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.  
• Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.  
• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

1. QU'EST-CE QUE ATUSSINE® ADULTES ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

**Classe pharmacothérapeutique**  
ANTITUSSIFS. SAUF ASSOCIATIONS AUX EXPECTORANTS, ALCALOÏDES DE L'OPIMUM ET DERIVÉS.

**Indications thérapeutiques**  
Ce médicament est préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant de plus de 15 ans, en particulier lorsqu'elles surviennent la nuit.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE ATUSSINE® ADULTES ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament  
Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

**Contre-indications**  
Ne prenez jamais ATUSSINE® ADULTES dans les cas suivants:  
• Enfants de moins de 15 ans.  
• Allergie à l'un des constituants.  
• Toux chez l'asthmatique.  
• Insuffisance respiratoire.  
• Troubles de la prostate ou de difficultés à uriner.  
• Glaucome.  
• Allaitement.  
• En association avec certains médicaments utilisés dans la dépression .  
Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ, pendant le premier trimestre de la grossesse.  
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN  
**Précautions d'emploi; mises en garde spéciales**  
Faites attention avec ATUSSINE® ADULTES :

**Mises en garde spéciales**  
Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques. Si la toux devient grasse, s'accompagne de crachats, de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.

En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

**Précautions d'emploi**  
En cas de maladie au long cours du foie ou des reins, CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN afin qu'il adapte la posologie.  
Des précautions sont nécessaires chez les personnes âgées prédisposées:  
• aux constipations,  
• aux vertiges ou à la somnolence  
• présentant des troubles de la prostate.

**PREVENEZ VOTRE MEDECIN** avant de prendre ce médicament.  
La prise de boissons alcoolisées ou d'un médicament contenant de l'alcool est déconseillée durant ce traitement.

Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique) lors du traitement par ce médicament contenant un antitussif.

Ce médicament contient des agents colorants azoïques, Jaune orangé S et Rouge cochenille A, et peut provoquer des réactions allergiques.  
L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).  
Ce médicament contient 12 g de saccharose par cuillère à soupe, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

**Interactions avec d'autres médicaments**  
Prise ou utilisation d'autres médicaments  
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS notamment avec certains médicaments utilisés dans la dépression, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Ce médicament contient, un antitussif, le dextrométhorphan, un antihistaminique, la mépyramine. D'autres médicaments en contiennent.  
Ne les associer pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir Posologie et Mode d'administration).

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

**Grossesse**  
L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant, le premier trimestre de la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin: lui seul pourra adapter le traitement à votre état.  
En fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né (notamment troubles respiratoires). Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement préconisées.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Allaitement**  
Ce médicament passe dans le lait maternel.  
De trop fortes doses, administrées chez les femmes qui allaitent, peuvent entraîner des arrêts respiratoires ou des baisses du tonus du nourrisson. En conséquence, la prise de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.  
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

**Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**  
L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament.  
Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées.  
Il est préférable de commencer ce traitement le soir.

3. COMMENT PRENDRE ATUSSINE® ADULTES ?

**Posologie**  
RESERVE A L'ADULTES ET L'ENFANTS DE PLUS DE 15 ANS.  
En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter votre médecin.  
La dose quotidienne de dextrométhorphan est de 120 mg par jour chez l'adulte. Les prises devront être espacées de 4 heures au minimum.  
La posologie usuelle :  
• chez l'adulte: une demi à une cuillère à soupe par prise. La dose pourra être renouvelée au bout de 4 heures si besoin. Ne pas dépasser 4 cuillères à soupe par jour.  
• chez le sujet âgé ou en cas d'insuffisance hépatique ou rénale: consulter votre médecin afin d'adapter la posologie.

**Mode d'administration**  
VOIE ORALE.  
**Fréquence d'administration**  
Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.  
Compte tenu de l'effet sédatif de ce médicament, il est préférable de le prendre plutôt le soir.

**Durée de traitement**  
Le traitement ne devra pas dépasser 8 jours sans avis médical, et être limité aux moments où survient la toux.

**Symptômes et instructions en cas de surdosage**  
Si vous avez pris plus d'ATUSSINE® ADULTES que vous n'auriez dû :  
En cas de surdosage aigu, les symptômes observés suivants peuvent survenir : nausées et vomissements, tachycardie (battements de cœur rapides) et hypertension artérielle, rétention urinaire, mydriase et troubles de l'accommodation, signes neuropsychiques : vertige, ataxie (problèmes de coordination des mouvements), hallucinations, nystagmus, somnolence, confusion, agitation, hyperexcitabilité et hypertonie (tension musculaire).  
Les surdosages sévères peuvent entraîner convulsions, hyperthermie, coma et dépression respiratoire (insuffisance respiratoire).  
En cas de surdosage suspecté, contactez immédiatement un médecin.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**  
**Description des effets indésirables**  
• Certains effets nécessitent d'ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE TRAITEMENT ET D'AVERTIR UN MÉDECIN.

• **Réactions allergiques:**  
• de type éruption cutanée (érythèmes, eczéma, purpura, urticaire),  
• crise d'asthme,  
• œdème de Quincke (urticaire avec brusque gonflement du visage et du cou pouvant, entraîner une gêne respiratoire),  
• choc anaphylactique.

• **Baisse importante des globules blancs dans le sang** pouvant se manifester par l'apparition ou l'aggravation d'une fièvre accompagnée ou non de signes d'infections.

• **Diminution anormale des plaquettes dans le sang** pouvant se traduire par des saignements de nez ou des gencives.

• D'autres sont plus fréquents:  
• **Somnolence, baisse de la vigilance**, plus marquées en début de traitement.  
• **Baisse de la mémoire ou de la concentration, vertiges** (plus fréquents chez le sujet âgé).

• **Incoordination motrice.**  
• **Sécheresse de la bouche, troubles de l'accommodation, rétention d'urine, constipation, palpitations, baisse de pression artérielle.**  
• **Rarement:** nausées, vomissements, gêne respiratoire.

**Déclaration des effets secondaires**  
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ATUSSINE® ADULTES ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.  
Ne pas utiliser ATUSSINE® ADULTES après la date de péremption mentionnée sur le flacon.

**Conditions de conservation**  
A conserver à une température inférieure à 25° c  
Le flacon doit être conservé dans l'emballage extérieur, à l'abri de la lumière.  
Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration  
Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

**6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**  
**Liste complète des substances actives et des excipients**  
Que contient ATUSSINE® ADULTES ?  
**Les substances actives sont:**  
Bromhydrate de dextrométhorphan ..... 0,20000 g  
Maléate de mépyramine ..... 0,20000 g

Pour 100 ml de sirop.

Une demi-cuillère à soupe (7,5 ml) contient 15 mg de bromhydrate de dextrométhorphan, 15 mg de maléate de mépyramine et 6 g de saccharose.  
Une cuillère à soupe (15 ml) contient 30 mg de bromhydrate de dextrométhorphan, 30 mg de maléate de mépyramine et 12 g de saccharose.

**Liste des excipients à effet notoire:**  
saccharose, jaune orangé S (E110), rouge cochenille A (E124),benzoate de sodium.

**Les excipients sont :**  
Acide citrique monohydraté, arôme abricot, jaune orangé S (E110), rouge cochenille A (E124), eau purifiée.

**Forme pharmaceutique et contenu**  
Qu'est-ce que ATUSSINE® Adultes et contenu de l'emballage extérieur ?  
Ce médicament se présente sous forme de sirop. Flacon de 125 ml.



Union Pharmaceutique Constantinoise  
DETENTEUR DE LA DECISION D'ENREGISTREMENT /FABRICANT /CONDITIONNEUR :  
UPC,Zone industrielle,le Rhumel N° 49 ,25000 Constantine - Algérie.  
DE N°: 08/03/20B102/285  
Date de la dernière révision de la notice : Septembre 2018

# أتوسين® للكبار

بروميدرات ديكستروميثورفان/ماليات الميبيرامين

شراب

0,2 غ/0,2 مل 100 مل

**يرجى قراءة النشرة بعناية قبل تناول هذا الدواء. إنها تحتوي على معلومات هامة بالنسبة لدواءك.**  
إذا كان لديك أسئلة، إذا كان لديك أي شك، اسأل طبيبك أو الصيدلي.  
حافظ على هذه النشرة، قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.  
إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات والمشورة، اتصل بالصيدلي.  
لا تأخذ أساميت الأعراض أو لا تزال قائمة، استشر طبيبك.  
إذا لاحظت أي آثار جانبية غير المدرجة في هذه النشرة، أو إذا كنت تواجه أي من الآثار الجانبية الخطيرة، يرجى إخبار الطبيب أو الصيدلي.

## 1. ماهو أتوسين® للكبار وما هي دواعي استخدامه؟

**الغسم الصيدلاني العلاجي**

مضاد للسعال باستثناء مزيج بلغم، آشياء قوليديات الأفون ومشقاته.

**دواعي الاستعمال**

ينصح هذا الدواء لتهنئة السعال الجاف و سعال الإثارة للكبار والأطفال فوق 15 سنة،

وخاصة خلال أزمات المساء أو الليل.

## 2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل تناول أتوسين® للكبار

**قائمة بالمعلومات اللازمة قبل تناول الدواء**

إذا كان لديك أي من الحالات التالية، اتصل بالطبيب قبل تناول هذا الدواء.

**موانع الاستعمال**

لا تتناول أتوسين® للكبار أبداً في الحالات التالية:

الأطفال دون سن 15 عاماً.

الحساسية لأي من المكونات.

السعال الربوي.

ضيق في التنفس.

اضطراب إليات البروستات أو صعوبة في التبول.

الزرق.

الرضاعة الطبيعية.

الاشتراك مع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب (MAOIs).

هذا الدواء عموماً يجب ألا يستخدم، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

إذا كنت على شك، فمن الضروري أن تسأل الطبيب أو الصيدلي

**احتياطات الاستعمال : تحذيرات خاصة**

**كن حذراً مع أتوسين® للكبار :**

**تحذيرات خاصة**

لا تتناول هذا الدواء في حال السعال المتغير. في هذه الحالة، السعال يتطلب الدفاع الطبيعي لإخلاء

الفرات الشعب الهوائية.

إذا أصبح السعال مصحافاً مفرقاً بالبلغم، والحمى، يطلب المشورة من الطبيب.

في حالة المرض المزمن (طويل الأجل) من النضبات الهوائية أو الرتينين يرافقه السعال مع البلغم،

يجب الاستشارة الطبية.

**احتياطات الاستعمال**

في حالة المرض المزمن على المدى الطويل في الكبد أو الكلى، استشر طبيبك لتعديل الجرعة.

الاحتياطات اللازمة عند كبار السن:

- الإمساك،

- الدوار أو النعاس

- وجود مشاكل البروستات.

أخبر طبيبك قبل تناول هذا الدواء

لا ينصح تناول الكحول أو الأدوية التي تحتوي على الكحول خلال فترة العلاج.

ينبغي أن لا يرتبط دواء ترقيق إفرازات الشعب الهوائية (مقطع، حال البلغم) أثناء العلاج مع هذا

الدواء لأنه يعمل على منع السعال.

هذا الدواء يحتوي على المولونات الأزوية والأصفرس وأحمر فرمزي، ويمكن أن يسبب

الحساسية.

لا ينصح استخدام هذا الدواء للعرضي الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز، سوء امتصاص

الجلوكوز والجلاكتوز أو سكروز / إيزومالتوز (مرض وراثي نادر).

هذا الدواء يحتوي على 12 غرام من السكر في ملعقة كبيرة، الشيء الذي ينبغي أخذه بعين

الاعتبار للحصة اليومية في حالة اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو في حالة مرض السكري.

إذا كنت في شك لا تتردد في استشارة الطبيب أو الصيدلي.

**التفاعل مع أدوية أخرى**

**أخذ أو استعمال أدوية أخرى**

لتجنب التفاعلات المحتملة بين الأدوية خاصة مع بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب، يجب

الإبلاغ على أي علاج جاري أو طبيبك أو الصيدلي.

يحتوي هذا الدواء للسعال على: ديكستروميثورفان، مضادات الهيستامين، ميبيرامين. والتي توجد

في أدوية أخرى.

لا تتجمع بين عدة أدوية، حتى لا يتجاوز الحد الأقصى للجرعة الموصى بها (انظر الجرعة وطريقة

الاستعمال).

## الاستعمال خلال فترة الحمل والرضاعة

**الحمل**

لا ينصح تناول هذا الدواء خلال الثلث أشهر الأولى من الحمل.

إنما اكتشفي أنك حامل أثناء العلاج، استشري الطبيب بسرعة لأنه وحده قادر على تعديل العلاج

لهذاك

في أواخر الحمل، كثرة استعمال هذا الدواء قد يسبب آثاراً سلبية للأطفال حديثي الولادة

وخصوصاً الجهاز التنفسي). لذلك، يجب أن نسمي دائماً استشارة الطبيب قبل استخدام

ولا نتجاوز الجرعة الموصى بها ومدة العلاج.

اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

**الرضاعة**

يمر هذا الدواء في حليب الثدي.

الجرعات العالية جداً، التي تعطي للنساء المرضعات، يمكن أن تسبب توقف التنفس أو تقلل من

لهجة الرضيع. وفقاً لذلك، في هذا الدواء لا ينصح استعماله أثناء الرضاعة.

اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

**آثار على القدرة على القيادة واستخدام الآلات**

يسبب على الانتباه، خاصة بالنسبة للسائقين ومشغلي الآلات، لأن احتمالات النعاس مرتبطة باستخدام

هذا الدواء.

وتنبرز هذه الحالة عند استهلاك المشروبات الكحولية.

من الأفضل بدء العلاج في المساء.

## 3. كيف يتم تناول أتوسين® للكبار ؟

**الجرعة**

مخصص للكبار والصغار الأكبر من 15 سنة

في غياب الفعالية، لا يجب تجاوز الجرعة الموصى بها، لا تتناول شراب آخر للسعال في آن

واحد، استشر الطبيب.

الجرعة اليومية من ديكستروميثورفان 120 ملغ يومياً للبالغين

يجب أن تكون الجرعات متباعدة على الأقل بـ 4 ساعات،

**الجرعة المعتادة:**

الكبار: نصف إلى ملعقة كبيرة لكل جرعة. ويمكن تكرار الجرعة بعد 4 ساعات إذا لزم الأمر. لا

تتجاوز 4 ملاعق كبيرة يومياً.

لكبار السن أو المرضى الذين يعانون من إختلال كبدي أو كلوي: يجب مراجعة الطبيب لتحديد

الجرعة.

**طريقة الاستعمال**

عن طريق الفم.

**تردد الاستعمال**

يجب أن تكون الجرعة متباعدة على الأقل بـ 4 ساعات.

ونظراً للتأثير المهدئ للدواء من الأفضل تناوله في المساء.

**مدة العلاج**

ينبغي أن لا تتجاوز 8 أيام دون استشارة طبية، ويقتصر على الأوقات التي يحدث فيها السعال.

**الأعراض والتلويحات في حال الجرعة الزائدة**

إذا أخذت أتوسين® للكبار أكثر مما يجب:

في حالة زيادة الجرعة الحادة، الأعراض الملاحظة هي: الغثيان والتقيؤ، عدم انتظام دقات القلب

(سرعة دقات القلب)، ارتفاع ضغط الدم واحتباس البول، توسع حدة العين و اضطرابات الإقائمة،

الأعراض العصبية: دوخة، وترنح (مشاكل التنسيق الحركات)، والهلاوس، رآرة، والنعاس،

والارتباك، والإثارة، فرط الاستثارية وفرط التوتر (الشد العضلي).

الجرعات زائدة الشدة يمكن أن تسبب المضبوطات، وارتفاع الحرارة و الغيبوبة و صعوبة التنفس

(نقص في التنفس)

في حال الجرعة الزائدة، اتصل بالطبيب فوراً.

## 4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

**وصف الآثار الجانبية**

تتطلب بعض الآثار التوقف فوراً عن العلاج وإخبار الطبيب.

**\* الحساسية:**

- نوع الطحج الحاد (حماسي، والأكرزما، فرقية، الشرى)

- نوبة الربو،

- ودمة وغثية (الشرى مع تورم مفاجئ في الوجه والرقبة يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس).

- صدمة الحساسية.

**\* النقص وبشكل كبير من خلايا الدم البيضاء في الدم** يمكن أن يتجلى في ظهور أو

عودة ظهور حمى مع أو بدون علامات العدوى.

**\* انخفاض غير طبيعي للمصالح الدموية في الدم** يمكن أن يؤدي إلى نزيف الأنف أو

الثآليل.

**البعض الآخر أكثر تواتراً:**

**النعاس وانخفاض اليقظة**، أكثر وضوحاً في بداية العلاج

**\* انخفاض محسوس للذاكرة أو التركيز، والدوار (أكثر شيوعاً للمسنين)**

**\* جفاف الفم، عدم وضوح الرؤية، واحتباس في البول، والإمساك، والخفقان،**

**والخفاض ضغط الدم.**

نادر: الغثيان، والتقيؤ، وصعوبة في التنفس.

**الإبلاغ عن الآثار الجانبية**

إذا كان لديك أي آثار جانبية، يجب التحدث مع طبيبك أو الصيدلي. وهذا ينطبق أيضاً على أي

آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك مساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة

الدواء.

## 5. كيفية حفظ أتوسين® للكبار ؟

يحفظ بعيداً عن متناول ومراى الأطفال.

**تاريخ انتهاء الصلاحية**

لا تستخدم أتوسين® للكبار بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على القارورة.

**شروط الحفظ**

يحفظ في حرارة أقل من 25°م.

يجب أن يتم تخزين القارورة في العلبة الخارجية، بعيداً عن الضوء.

إذا لزم الأمر، يجب التحذير من بعض العلامات الواضحة **للتدهور**

لا ينبغي أن يتم التخلص من الأدوية من خلال مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل

الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية. ومن شأن هذه التذيرات أن تساعد على حماية البيئة.

**6. مزيد من المعلومات**

**قائمة كاملة من المواد الفعالة والسواغات**

ما هو أتوسين® للكبار ؟

**المواد الفعالة هي:**

بروميديرات ديكستروميثورفان ..... 0,20000 غرام

ماليات ميبيرامين ..... 0,20000 غرام

لكل 100 مل من الشراب.

نصف ملعقة (7,5 مل) تحتوي على 15 ملغ من بروميديرات ديكستروميثورفان، 15 ملغ من

ميبيرامين و 6 غ سكروز.

ملعقة طعام واحدة (15 مل) تحتوي على 30 ملغ من بروميديرات ديكستروميثورفان، 30 ملغ من

ميبيرامين و 12 غرام من السكر.

**قائمة السواغات ذات تأثير ملحوظ:** السكروز، أحمر فرمزي، أصفر البرتقالي، س، وبزوات الصوديوم.

**المكونات الأخرى هي:**

مونوهيدرات حامض الستريك، نكهة المشمش، والمياه النقية.

**الشكل الدوائي والمحتوى:**

**ماهو أتوسين® للكبار ومحتويات الغلاف الخارجي.**

هذا الدواء على شكل شراب، قارورة تحتوي 125 مل.



Union Pharmaceutique Constantinoise

صاحب مقرّر للتسجيل /الصانع/ المعين

U.P.C المنطقة الصناعية الغزال، رقم 49 25000 قسنطينة. الجزائر.

رقم مقرر التسجيل: 08/03/20B102/285

آخر تاريخ تم فيه مراجعة النشرة: سبتمبر 2018