MADECOSID ®

Poudre à 2%

Extrait de CENTELLA ASIATICA

FORME PHAR MACEUTIQU E, PRESEN TATION ET COMPOSITION :
Poudre de 2% - Flacon de 2 g
Principe actif : Asiaticoside (Triterpènes de Centella Asiatica)……..... 0.04g
Excipients : Magnésium stéarate, talc…… q.s.p ……..…… 2g de poudre

PROPRI ETES :
La fraction totale Triterpènique de Centella asiatica exerce un effet marqué de modulation sur le développement du tissu connectif par une action directe aussi bien sur les fibroblastes que sur les deux acides aminés fondamentaux dans le métabolisme du collagène, la proline et l'alanine. On obtient ainsi une stimulation des processus de cicatrisation, une réépithélisation améliorée ainsi qu'une normalisation du tissu connectif périvasculaire. Tout ceci se reflète dans une réduction de la perméabilisation de l'endothélium vasculaire et dans un rétablissement de l'équilibre hémodynamique du système microvasculaire.
MADECOSID est dépourvu de toxicité, aussi bien chez l'adulte que chez les fœtus et il est bien toléré dans les traitements par voie épicutanée.

INDI CATIONS :
Dans le traitement topique de l'ulcère variqueuse, des escarres, des brûlures d'origine différente; dans les retards de cicatrisation.

CONTRE-INDI CATIONS :
Hypersensibilité vérifiée aux principes actifs du médicament , ou à l'un des excipients.

PRECAUTIONS :
Au cas où il y aurait des lésions, il faudra associer une thérapie antibactérienne.
Formes non adaptées à l'usage ophtalmique.
La poudre est particulièrement réservée aux lésions suintantes ; ne pas utiliser la poudre sur des plaies profondes.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:
l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandé pendant le premier trimestre de grossesse , et sous sourveillance médical les autres mois de grossesse

INTERACTIONS MEDI CAMENTEUSES :
On ne connaît aucune interaction avec d'autres médicaments.

EFF ETS SECONDAIRES :
Aucun effet secondaire n'a été signalé. Parfois après traitements prolongés, il peut se manifester une sensibilisation locale, telles que prurit, sensation de brûlures et éruption eczématiforme. Dans ce cas, le traitement doit être interrompu, il faudra instaurer une thérapie substitutive.

POSOLOGIE :
Application de poudre selon les besoins, en général 1 ou 2 fois par jour.
Mode et voie d'administration :
poudre pour application locale et externe .

MODE D'EMPLOI :
Appliquer la poudre sur les lésions après désinfection et suivant le rythme des pansements.

SURDOS AGE :
Aucun cas de surdosage n'a été communiqué.

CONSERVATION :
Conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit frais et sec.
Ne pas laisser à la portée ni à la vue des enfants.
N° Décision d'enregistrement : 22/18/07 A 001/285

Derniére date de révision : janvier 2023

N05MAD231

Détenteur de la décision d'enregistrement /Fabricant /conditionneur /libérateur :
S.P.A Union Pharmaceutique constantinoise production
Cité Djnene el Zeitoune, rue Lamoricière N° 07A, Constantine – Algérie

مديكوزيد®

مســـحـــوق 2%

مستخلص ســانتيلا اسيــاتيكــا

الشكل الصيدلاني، العرض و التركيب :

مسحوق 2% - قارورة 2 غ

المادة الفعالة: اسياتيكوزيد (تريتربان من مستخلص سانتيلا اسياتيكا)..... 0,04 غ

سواغات: ستيبارات المغنيزيوم، طلق..... ك.ك.ل..... 2 غ من المسحوق

الخصائص

مجموع نسبة التريتربينات من سانتيلا اسياتيكا يمارس أثرا عميقا في تحسين و تسوية النسيج الضام المحيط بالأوعية بعمل مباشر سواء على الفيبروبلاست أو على إثنين من الأحماض الأمينية الأساسية في تشكيل الكولاجين، البرولين و الألنين.

و هذا يحفز عملية الشفاء، تحسن و تطبيع رابط الأنسجة و الأوعية الدموية. كل هذا ينعكس في خفض قابلية نفاذ السوائل من الأوعية الدموية و في تحقيق توازن أفضل لنظام الأوعية الدموية.

إن مديكوزيد غير سام، عند كل من البالغين و عند الجنين و جيد التحمل في العلاج على سطح الجلد.

دواعي الاستعمال:

في العلاج الموضعي لقرحة الدوالي، تقرحات الفراش، حروق من أصول مختلفة و تأخر في إلتأم الجروح.

موانع الاستعمال:

فرط الحساسية المؤكدة للمادة الفعالة ، أو لأحد السواغات.

الاحتياطات:

في حالة وجود إصابات، يجب إشراك علاج مضاد للبكتيريا.

هذا الشكل غير ملائم للاستخدام في العيون.

المسحوق مخصص للاستعمال في المناطق الرطبة من الجروح، لا يجب استعمال المسحوق على الجروح العميقة.

التداخلات الدوائية:

لا تعرف تداخلات مع أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة :

لا يوصى باستخدام هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتحت الإشراف الطبي الأشهر المتبقية من الحمل

الآثار الجانبية :

لم يذكر أي أثر جانبي، أحيانا بعد علاج لمدة طويلة، يمكن أن تحصل حساسية محلية مثل حكة، شعور بحروق، إكزيما والطفح الجلدي. في هذه الحالة يجب إيقاف العلاج و إعطاء علاج بديل.

المقادير الصيدلانية:

تطبيق المسحوق حسب الحاجة، عادة 1 أو 2 مرات في اليوم.

طريقة الاستعمال:

مسحوق للاستعمال الموضعي و الخارجي

تطبيق المسحوق على الإصابات بعد تطهيرها و حسب وتيرة التضميد.

الجرعة الزائدة:

لا توجد أي حالات للجرعات المفرطة قد تم الإبلاغ عنها.

الحفظ:

يحفظ بعيدا عن الضوء، في مكان معتدل و جاف.

لا يترك في متناول و مرأى الأطفال.

رقم مقرر التسجيل : 22/18/07 A 001/285

تاريخ مراجعة النشرة : جانفي 2023

صاحب مقرر التسجيل الصانع/المعبىء/المحرر

ش.ذ.ا الاتحاد الصيدلاني القسنطيني إنتاج.حي جنان الزيتون حي لاموريسيار رقم 107، قسنطينة- الجزائر

N05MAD231